

Kwiaty 20%	
Babka średnia	<i>Plantago media</i>
Brodawnik jesienny	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>
Brodawnik zwyczajny	<i>Leontodon hispidus</i>
Chaber bławatek	<i>Centaurea cynaus</i>
Chaber łąkowy	<i>Centaurea jacea</i>
Dzwonek jednostronny	<i>Campanula rapunculoides</i>
Dzwonek okrągłolistny	<i>Campanula rotundifolia</i>
Fiołek polny	<i>Viola arvensis</i>
Głowienka pospolita	<i>Prunella vulgaris</i>
Goździk kropkowany	<i>Dianthus deltoïdes</i>
Jastrzębiec kosmaczek	<i>Hieracium pilosela</i>
Komonica zwyczajna	<i>Lotus corniculatus</i>
Koniczyna drobnogłówkowa	<i>Trifolium dubium</i>
Koniczyna łąkowa	<i>Trifolium pratense</i>
Krwawnik pospolity	<i>Achillea millefolium</i>
Krwiściąg mniejszy	<i>Sanquisorba minor</i>
Lebiodka pospolita	<i>Origanum vulgare</i>
Lepnica nocna	<i>Silene noctiflora</i>
Lepnica rozdęta	<i>Silene vulgaris</i>
Lnica pospolita	<i>Linaria vulgaris</i>
Lucerna nerkowata	<i>Medicago lupulina</i>
Macierzanka zwyczajna	<i>Thymus pulegioides</i>
Mydlnica lekarska	<i>Saponaria officinalis</i>
Pępawa zielona	<i>Crepis capillaris</i>
Prosiennicznik szorstki	<i>Hypochaeris radicata</i>
Przytulia biała	<i>Galium album</i>
Przytulia właściwa	<i>Galium verum</i>
Rezeda żółta	<i>Reseda lutea</i>
Śláz piżmowy	<i>Malva moschata</i>
Śláz zaniedbany	<i>Malva neglecta</i>
Złocień właściwy	<i>Leucanthemum vulgare</i>

Skład gatunkowy

Łąka Do Sadu

Trawy 80%	
Grzebieńnica pospolita	Cynosurus cristatus
Kostrzewa czerwona	Festuca rubra
Kostrzewa owcza	Festuca ovina
Mietlica pospolita	Agrostis capillaris
Stokłosa żytnia	Bromus secalinus
Tomka wonna	Anthoxanthum odoratum
Wiechlina wąskolistna	Poa angustifolia
Wiechlina spłaszczona	Poa compressa
Życica trwała	Lolium perenne